

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 3-5-83164304

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

28 AVRIL 1983

- N° 2 -

VIGNE

édition du LIMOUXIN

(rédigé en collaboration avec la CAVALE)

OIDIUM

Cette maladie est restée le problème dominant du vignoble en 82. Vous devez traiter dès que vos vignes ont atteint le stade 3 feuilles.

Utilisez une des solutions suivantes :

- Bayleton 5 200 g/hl soit 400 g/hectare.
- Rubigan 4 0,60 l/hl soit 0,120 l/hectare.

Ces deux produits sont à préférer en traitement précoce en raison de leur indifférence aux conditions climatiques que nous connaissons actuellement.

- soufre micronisé mouillable 3 kilos/hectolitre soit 6 kilos/hectare dans 200 litres d'eau/hectare à appliquer de préférence avec la lance à la main.

Les ACARIENS

Si vous les observez, mélangez au fongicide anti - oïdium une des spécialités commerciales suivantes choisies parmi celles existantes :

- Fac super : 0,500 l/hl
- Artaban : 0,350 l/hl
- Neoron : 0,500 l/hl
- Kelthane : 0,350 kilo /hl
- Carbox : 0,350 kilo /hl

En cas de traitements répétés au cours de la campagne, veillez à ne pas utiliser deux fois de suite la même matière active (Artaban et Danitol seront de préférence réservés au traitement d'été).

La réussite d'un traitement dépend de la qualité d'application et du respect de la dose préconisée ; veillez au bon fonctionnement de vos appareils ; chaque partie de la végétation doit être touchée par la bouillie.